

BRODY 2,5 PASTE

RB – nástraha k přímému použití v sáčcích ve formě pasty

Účinná látka: brodifakum **0,0025 % (0,025 g/kg)**

Typ přípravku: 14 – Rodenticidní (regulace živočišných škůdců)

Číslo povolení: CZ-0019601-0000

VAROVÁNÍ

H373 Může způsobit poškození orgánů (krev) při prodloužené nebo opakované expozici.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P308+P313 Při expozici nebo požití na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc.

P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy.



Držitel povolení: KOLLANT S.r.l. – Via trieste 49/53, 35137 Padova Itálie
Výrobce: KOLLANT S.r.l. – Via C. Colombo, 7/7A 30030 Vigonovo (VE) Itálie

Distributor pro ČR: Samura s.r.o., Ke Klíčovu 8, 190 00 Praha 9
Tel. +420 724 052 404, samura@samura.cz, www.samura.cz

Balení: 150 g

Datum výroby: uvedeno na obalu

Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby

Oblast použití: uvnitř budov a v jejich okolí

Mechanismus účinku: BRODY 2,5 PASTE je rodenticidní požerová nástraha v sáčcích ve formě pasty, určená k přímému použití v deratizačních stanicích odolných proti náhlému otevření. Obsahuje antikoagulační látku brodifakum, která je účinná proti myši domácí (Mus musculus) a potkanovi (Rattus norvegicus) i po jednorázovém požití. Přípravek ovlivňuje proces srážlivosti krve a hladovci hynou za 4 až 10 dní po požití nástrahy na vnitřní vykrvácení. Přípravek nevyvoluje podezení u jiných členů populace hladovců. Přípravek obsahuje hořké činné látky, které zmírňují riziko náhodného požití dětí. Přípravek může být používán v budovách a v jejich okolí, např. v domech, sklepech, garážích, skladech a přilehlých zahradách. Je určen pro profesionální uživatele a širokou veřejnost.

Cílové organismy včetně vývojových stádií:

Myš domácí (Mus musculus) – mláďata, dospělci

Potkan (Rattus norvegicus) – mláďata, dospělci

Návod k použití: přípravek je určen k přímému použití v sáčcích ve formě pasty, sáčky by měly být umístěny do zřetelně označených stanic tak, aby bylo zřejmé, že obsahují rodenticid a že nesmí být přemisťovány ani otevřeny. Stanice by měly být odolné proti neoprávněné manipulaci a měly by chránit nástrahu před povětrnostními vlivy, před požitím necílovými organismy a před únikem do životního prostředí.

Před použitím si vždy přečtěte informace na obalu a rovněž veškeré informace přiložené k přípravku nebo poskytnuté v místě prodeje a řiďte se jimi. Před použitím rodenticidů je třeba zvážit nechemické metody regulace (např. pasty). Před položením nástrahy proveďte průzkum zamořené oblasti a posouzení na místě a určete druh hladovců, místa jejich aktivity a stanovte pravděpodobnou příčinu a rozsah zamoření. Odstraňte potraviny, které jsou pro hladovce snadno dosažitelné (např. rozsypané zrní nebo potravinový odpad). Kromě těchto opatření však zamořenou oblast těsně před zahájením deratizace nečištějte, neboť to populace hladovců jen vyruší a ztíží je to akceptaci nástrahy. Deratizační stanice by měly být umístěny v bezprostřední blízkosti míst, kde byla již dříve zaznamenána aktivita hladovců (např. stězky, hlizdiště, výkrmny, díry, nory atd.). Pokud je to možné, měly by deratizační stanice být připevněny k zemi nebo k jiným konstrukcím. Umístěte deratizační stanice mimo dosah dětí, ptáků, domácích zvířat, hospodářských zvířat a jiných necílových zvířat. Neumísťujte deratizační stanice v blízkosti potravin, nápojků a krmiv ani nástrojů nebo povrchů, které s nimi přicházejí do kontaktu. Neumísťujte deratizační stanice v blízkosti drenážních systémů, kde mohou přijít do styku s vodou. Při používání přípravku nejezte, nepijte a nekurte. Po použití přípravku si umyjte ruce a přímo zasaženou pokožku. Na konci období deratizace odstraňte zbývající nástrahu nebo deratizační stanice. Nástraha je nebezpečná pro volně žijící zvířata.

Dávkování a popis použití:

Myš domácí (Mus musculus) – interiéru

Do jedné deratizační stanice vložte 20-40 g nástrahy, 20 g odpovídá 1-2 kusům sáčků s pastou a 40 g 2-4 kusům sáčků s pastou. Je-li zapotřebí více deratizačních stanic, umístěte je od sebe ve

vzdálenosti 10-15 metrů, nesmí být od sebe vzdáleny méně než 5 metrů. Deratizační stanice je nutno kontrolovat jednou za 2-3 dny na počátku deratizace a následně nejméně jednou týdně s cílem ověřit, zda je nástraha akceptována, zda jsou stanice neporušené a za účelem odstranění té uhybných hladovců. V případě potřeby nástrahu doplňte.

Potkan (Rattus norvegicus) – interiéru

Do jedné deratizační stanice vložte 100-200 g nástrahy, 100 g odpovídá 5-10 kusům sáčků s pastou a 200 g odpovídá 10-20 kusům sáčků s pastou. Je-li zapotřebí více deratizačních stanic, umístěte je od sebe ve vzdálenosti 5-10 metrů, nesmí být od sebe vzdáleny méně než 5 metrů. Deratizační stanice je nutno kontrolovat jednou za 5-7 dní na počátku deratizace a následně nejméně jednou týdně s cílem ověřit, zda je nástraha akceptována, zda jsou stanice neporušené a za účelem odstranění té uhybných hladovců. V případě potřeby nástrahu doplňte.

Potkan (Rattus norvegicus) – exteriéru (v okolí budov)

Do jedné deratizační stanice vložte 100-200 g nástrahy, 100 g odpovídá 5-10 kusům sáčků s pastou a 200 g odpovídá 10-20 kusům sáčků s pastou. Je-li zapotřebí více deratizačních stanic, umístěte je od sebe ve vzdálenosti 5-10 metrů, nesmí být od sebe vzdáleny méně než 5 metrů. Deratizační stanice umístěte na místa, kde nehrozí záplavy. Pokud byla nástraha v deratizační stanici poškozena vodou nebo kontaminována nečistotami, nástrahu vyměňte. Deratizační stanice je nutno kontrolovat jednou za 5-7 dní na počátku deratizace a následně nejméně jednou týdně s cílem ověřit, zda je nástraha akceptována, zda jsou stanice neporušené a za účelem odstranění té uhybných hladovců. V případě potřeby nástrahu doplňte.

Opatření ke zmírnění rizika: zvažte preventivní kontrolní opatření (ucpěte díry, odstraňte případné potraviny a nápoje co nejříve) s cílem zvýšit příjem přípravku a snížit pravděpodobnost opětovného zamoření. Nepoužívejte antikoagulační rodenticidy jako stálé vzhledy (např. k prevenci zamoření hladovci nebo k odhalení aktivy hladovců). Při použití tohoto přípravku by mělo dojít k vyhubení hladovců do 35 dnů. V případě, že jste měli na konci deratizace podezení na nedostatečnou účinnost přípravku (tj. pokud stále pozorujete aktivitu hladovců), vyžádejte radu dodavatele přípravku nebo se obraťte na deratizační službu. V průběhu deratizace vyhledejte a odstraňte uhybné hladovce, a to nejméně se stejnou frekvencí, s jakou kontrolujete deratizační stanice.

Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny první pomoci:

Tento přípravek obsahuje antikoagulační látku.

Při jeho požití se mohou objevit příznaky, a to i se zpožděním, mezi něž může patřit krvácení z nosu a z dásní. V závažných případech se mohou vyskytnout i krvení výrony a ve stolici a moči se může objevit krev. Antidotum: Vitamin K1 podávaný pouze zdravotnickými / veterinárními pracovníky.

V případě:

Potřísnění pokožky – omyjte pokožku vodou a následně vodou a mýdlem.

Zasažení očí – vypláchněte oči roztokem na vyplachování očí nebo vodou a udrzte víčka otevřená po dobu nejméně 10 minut.

Při orální expozici – vypláchněte ústa pečlivě vodou. Nikdy nepodávejte nic úst osobě v bezvědomí. Nevývolávejte zvracení.

V případě polknutí – okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a lékaři ukaže obal nebo etiketu přípravku. V případě požití domácím zvířetem kontaktujte veterinárního lékaře.

Deratizační stanice musí být označeny těmito informacemi: „nepřemisťujte a neotvírejte“, obsahuje přípravek na hubení hladovců“, „název přípravku nebo číslo povolení“, účinná látka (účinné látky) a „v případě nehody zavolejte toxikologické středisko“.

Telefonní číslo pro naléhavé situace:

Toxikologické informační středisko, Klinika pracovního lékařství VFN a 1. LF UK

Na Bojišti 1, 120 00, Praha 2, tel: 224 919 293 a 224 915 402

Další informace: vzhledem k jejich opožděnému působení jsou antikoagulační rodenticidy účinné 4 až 10 dní po požití nástrahy. Hladovci mohou přenášet onemocnění. Nedotýkejte se uhybných hladovců holými rukama, při jejich likvidaci používejte rukavice nebo nástroje, jako jsou například kštěř. Tento přípravek obsahuje hořkou látku a barvivo.

Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu: po skončení deratizace likvidujte nespolezobavovanou nástrahu a balení podle platných místních předpisů (jako nebezpečný odpad).

Skládování: skladujte na suchém, chlazeném a dobře větraném místě. Uchovávejte v uzavřeném obalu a chráňte před přímým slunečním světlem. Skladujte na místech mimo dosah dětí, ptáků a domácích a hospodářských zvířat.